formularium

SEDAP - Serviço de Assessoria a Profissionais
11 - 3819.4490
www.formularium.com.br

Novo Peeling Superficial para Tratamento das Olheiras

Associação entre ATA e Ácido Lático Reduz Olheiras em 93,3% dos Casos

Associação entre ATA e Ácido Lático Reduz Olheiras em 93,3% dos Casos

Objetivo do Estudo

Avaliar a eficácia de um *peeling* superficial contendo ATA a 3,75% e Ácido Lático a 15% na melhora da aparência de olheiras de 30 voluntários com fototipos cutâneos II a IV.

Resultados

O peeling foi realizado em sessões semanais, durante 4 semanas, de acordo com as diretrizes básicas para aplicação de *peelings* químicos. Após a aplicação, o peeling foi neutralizado com uma solução de arginina a 12%.

- Quase todos os pacientes apresentaram melhora estética significativa;
- A avaliação dos médicos foi de boa, ótima ou excelente em 93,3% dos casos;
- A avaliação dos pacientes correspondeu a boa, ótima ou excelente em 96,7% dos casos;
- O procedimento apresentou efeitos adversos leves e temporários, como edema, eritema, frosting, ressecamento e telangiectasias;
- Os efeitos permaneceram por 4 a 6 meses com uso correto de fotoprotetor.

Voluntária 1

Voluntária 2

Referências

Vavouli C1, Katsambas A, Gregoriou S, Teodor A, Salavastru C, Alexandru A, Kontochristopoulos G. Chemicalpeelingwithtrichloroaceticacidandlacticacid for infraorbitaldarkcircles. J CosmetDermatol. 2013 Sep;12(3):204-9. doi: 10.1111/jocd.12044.

formularium

SEDAP - Serviço de Assessoria a Profissionais
11 - 3819.4490
www.formularium.com.br

Protocolo *Peeling* Antiolheiras

Aplicação em Consultório

Passo 1

Pré-*peeling* - Limpeza da Pele

Alpure® 96	*qsp*
Wipe	*1 UN*

Aplicar sobre toda a região que irá receber o *peeling*.

Passo 2

Aplicação do *Peeling*

Ácido Tricloroacético	*3,75 %*
Ácido Lático	*15%*
Gel	*100 %*

Aplicação em consultório médico. O peeling deve ser aplicado em 4 camadas distintas, sendo as camadas 1 a 3 com duração entre 1 a 2 minutos, e a última camada com duração de 5 minutos, totalizando aproximadamente 10 minutos de sessão para posterior aplicação do neutralizante.

Passo 3

Neutralização - Solução de Arginina

Arginina	*12%*
Solução qsp	*30 ml*

Aplicar sobre toda a região que recebeu o *peeling*.

Passo 4

Pós-*peeling* Imediato

Neurolight®	*1,5%*
Belides™	*3,0%*
Pro BarrierRepair	*0,5%*
ISO Creme qsp	*30 g*

Aplicar sobre toda a região que recebeu o *peeling*.

Creme Placebo



Creme com P.B.R.



Creme contendo 0,5% de Pro BarrierRepair resultou em um claro aumento da espessura.

- Belides™ é um extrato obtido da flor da margarida (Bellisperennis), que reduz a hiperpigmentação pós-inflamatória que pode ocorre no pós-peeling.
- Pro Barrier Repair é um ativo cosmético que atua protegendo e reconstruindo a camada epidérmica e dérmica da pele.
- Neurolight® é um ingrediente neuroativo capaz de inibir a expressão da POMC e, dessa forma, controlar a superprodução de melanina, reduzindo a hiperpigmentação pós-inflamatória.